



هم کلاسی
Hamkelasi.ir


پاسخ کنکور سراسری سال ۹۸ (رشته ریاضی فیزیک)

سوال ۱۰۱: گزینه‌ها

روزنامه دیواری ورزش



$$9 + x = 16 \Rightarrow x = 7$$



۱۸ نفر در هیچ گروهی نیستند

سوال ۱۰۲: گزینه

$$A = \sqrt[5]{\sqrt[3]{16}} \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{4}{3}}$$

$$A = \sqrt[5]{\sqrt[3]{16}} 2^{\frac{4}{3}}$$

$$A = \sqrt[5]{2^2 \sqrt[3]{2^4}} \times 2^{\frac{4}{3}}$$

$$A = \sqrt[5]{\sqrt[3]{2^6 \times 2^4}} \times 2^{\frac{4}{3}} = \sqrt[5]{2^{10}} \times 2^{\frac{4}{3}} = \sqrt[3]{2^2} \times 2^{\frac{4}{3}} = 2^{\frac{2}{3}} \times 2^{\frac{4}{3}} = 2^{\frac{6}{3}} = 2^2$$

$$\Rightarrow 2A = \lambda \Rightarrow (2A)^{-\frac{1}{3}} = (\lambda)^{-\frac{1}{3}} = (2^2)^{-\frac{1}{3}} = 2^{-1} = \frac{1}{2}$$

سوال ۱۰۳: گزینه

$$(2m-1)x^2 + 6x + (m-2) = 0$$

$$\xrightarrow{\text{دو ریشه حقیقی}} \Delta' > 0 \Rightarrow 3^2 - (2m-1)(m-2) > 0 \Rightarrow 9 - (2m^2 - 4m - m + 2) > 0$$

$$\Rightarrow 7 - 2m^2 + 5m > 0 \Rightarrow 2m^2 - 5m - 7 < 0 \Rightarrow (m+1)(2m-7) < 0$$

$$\Rightarrow -1 < m < \frac{7}{2}$$

البته توجه کنید که سوال گفته معادله درجه دوم، پس ضریب x^2 نباید صفر باشد یعنی: $m \neq \frac{1}{2}$

$$-1 < m < \frac{7}{2} - \left\{ \frac{1}{2} \right\}$$

سوال ۱۰۴: گزینه ۱

$$f(x) = -x^2 + 2x + 5$$

$$f(x) = -x^2 + 2x - 1 + 1 + 5 = -(x - 1)^2 + 6$$

$$\begin{array}{c} \text{سه واحد به طرف } x\text{-های} \\ \xrightarrow{x \rightarrow x - 3} \\ \text{مثبت} \end{array} \rightarrow -(x - 4)^2 + 6$$

$$\begin{array}{c} \text{دو واحد به طرف } y\text{-های} \\ \xrightarrow{\text{منفی}} \\ \text{منفی} \end{array} \rightarrow -(x - 4)^2 + 4$$

$$-(x^2 - 8x + 16) + 4 = -x^2 + 8x - 16 + 4 > x$$

$$x^2 - 7x + 12 < 0 \Rightarrow (x - 4)(x - 3) < 0 \Rightarrow 3 < x < 4$$

سوال ۱۰۵: گزینه ۲

۱۴, ..., ۹۸

$$\text{تعداد} = \frac{98 - 14}{7} + 1 = 13$$

$$\text{مجموع} = \frac{13}{2}(14 + 98) = 728$$

سوال ۱۰۶: گزینه ۱

$$\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x+9} = \frac{1}{20} \right) 20(x)(x+9) \Rightarrow 20(x+9) + 20(x) = x^2 + 9x$$

$$\Rightarrow 20x + 180 + 20x = x^2 + 9x \Rightarrow 40x + 180 = x^2 + 9x$$

$$\Rightarrow x^2 - 31x - 180 = 0 \Rightarrow x(x - 31) = 180$$

$$\Rightarrow x(x - 31) = -5 \times -36 \text{ یا } 36 \times 5 \Rightarrow \begin{cases} x = -5 \\ x = 36 \end{cases}$$

سوال ۱۰۷: گزینه ۱

$$f = \{(1, 2), (2, 5), (3, 4), (4, 6)\}, \quad g = \{(2, 3), (4, 2), (5, 6), (3, 1)\}$$

$$\Rightarrow f^{-1} = \{(2, 1), (5, 2), (4, 3), (6, 4)\}$$

$$gof^{-1}: \begin{cases} 2 \xrightarrow{f^{-1}} 1 \xrightarrow{g} x \\ 5 \xrightarrow{f^{-1}} 2 \xrightarrow{g} 3 \rightarrow (5, 3) \\ 4 \xrightarrow{f^{-1}} 3 \xrightarrow{g} 1 \rightarrow (4, 1) \\ 6 \xrightarrow{f^{-1}} 4 \xrightarrow{g} 2 \rightarrow (6, 2) \end{cases}$$

$$\Rightarrow gof^{-1}: \{(5, 3), (4, 1), (6, 2)\}$$

$$\Rightarrow \frac{g}{gof^{-1}} = \left\{ \left(4, \frac{2}{1} \right), \left(5, \frac{6}{3} \right) \right\} = \{(4, 2), (5, 2)\}$$

سوال ۱۰: گزینه ۱

$$\begin{cases} f(x) = -2 + \left(\frac{1}{2}\right)^{Ax+B} \\ y = x^r - x \rightarrow \begin{cases} y(1) = 0 \\ y(2) = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f(1) = 0 \\ f(2) = 2 \end{cases} \\ f(1) = -2 + \left(\frac{1}{2}\right)^{A+B} = 0 \Rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^{A+B} = 2 \Rightarrow A+B = -1 \\ f(2) = 2 \Rightarrow -2 + \left(\frac{1}{2}\right)^{2A+B} = 2 \Rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^{2A+B} = 4 = 2^2 \Rightarrow 2A+B = -2 \\ \Rightarrow \begin{cases} 2A+B = -2 \\ A+B = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = -1 \\ B = 0 \end{cases} \\ \Rightarrow f(x) = -2 + \left(\frac{1}{2}\right)^{-x} \Rightarrow f(3) = -2 + \left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = -2 + \frac{1}{8} = -\frac{15}{8} \end{cases}$$

سوال ۱۰: گزینه ۲

$$\begin{aligned} \tan \frac{11\pi}{4} + \sin \frac{15\pi}{4} \cos \frac{13\pi}{4} &= \tan \frac{11\pi}{4} = \tan \left(\frac{12\pi - \pi}{4} \right) \\ &= \tan \left(3\pi - \frac{\pi}{4} \right) = -\tan \frac{\pi}{4} = -1 \\ \sin \frac{15\pi}{4} &= \sin \left(\frac{16\pi - \pi}{4} \right) = \sin \left(4\pi - \frac{\pi}{4} \right) = -\sin \frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \cos \frac{13\pi}{4} &= \cos \left(\frac{12\pi + \pi}{4} \right) = \cos \left(3\pi + \frac{\pi}{4} \right) = \cos \left(\pi + \frac{\pi}{4} \right) = -\cos \frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ A &= -1 + \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \right) \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \right) = -1 + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

سوال ۱۱: گزینه ۳

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin a \cos x + \cos a \sin x - \sin a}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(a+x) - \sin a}{x}$$

تعریف مشتق $\sin x$ است

$$\underline{HOP} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(a+x)}{1} = \cos a$$

سوال ۱۱۱: گزینه ۳

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3x-6}{x-\sqrt{x+2}} & x > 2 \\ ax-1 & x \leq 2 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{3x-6}{x-\sqrt{x+2}} = \underset{\circ}{\text{HOP}} \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{3}{1 - \frac{1}{2\sqrt{x+2}}} = \frac{3}{1 - \frac{1}{4}} = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} ax-1 = 2a-1 \Rightarrow 2a-1 = 4 \Rightarrow a = \frac{5}{2}$$

سوال ۱۱۲: گزینه ۳

$$y = 1 + a \sin bx \cos bx = 1 + \frac{a}{2} \sin 2bx$$

با توجه به شکل هم علامت هستند و چون در گزینه هم مثبت هستند a و b را مثبت در نظر می گیریم:

$$y_{\max} = 1 + \frac{a}{2} = \frac{3}{2} \Rightarrow \frac{a}{2} = \frac{1}{2} \Rightarrow a = 1$$

$$T = \frac{3\pi}{4} - \left(-\frac{\pi}{4} \right) = \pi \Rightarrow \frac{2\pi}{2b} = \frac{\pi}{b} = \pi \Rightarrow b = 1$$

$$\Rightarrow a + b = 2$$

سوال ۱۱۳: گزینه ۱

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1 - \frac{1}{2} \sin 2x \Rightarrow (\sin x + \cos x)(\sin^2 x - \sin x \cos x + \cos^2 x)$$

$$= 1 - \frac{1}{2} \sin 2x \Rightarrow (\sin x + \cos x) \left(1 - \frac{1}{2} \sin 2x \right) = 1 - \frac{1}{2} \sin 2x$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 1 - \frac{1}{2} \sin 2x = 0 \Rightarrow 1 = \frac{1}{2} \sin 2x \Rightarrow \sin 2x = 2 \quad \text{غیرقائمه} \\ \sin x + \cos x = 1 \Rightarrow \sqrt{2} \sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right) = 1 \Rightarrow \sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x + \frac{\pi}{4} = 2k\pi + \frac{\pi}{4} \Rightarrow x = 2k\pi \Rightarrow x = 0, 2\pi \\ x + \frac{\pi}{4} = 2k\pi + \frac{3\pi}{4} \Rightarrow x = 2k\pi + \frac{\pi}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} \end{array} \right.$$

$$\text{مجموع جواب ها} = 0 + 2\pi + \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{2}$$

سوال ۱۱۴: گزینه

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x - 5}{x^2 + ax + b} = -\infty$$

واضح است که $x = 2$ ریشه مضاعف مخرج است یعنی مخرج برابر است با $4 + 4$ پس $(x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4$ است. $a + b = 0$.

سوال ۱۱۵: گزینه

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \frac{4}{3}, \quad g(x) = x + \sqrt{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \text{تعریف مشتق}$$

$$\Rightarrow f'(2) = \frac{4}{3}, \quad g'(x) = 1 + \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$(f \circ g)'(1) = g'(1) \cdot f'(g(1)) \Rightarrow \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{1}}\right) f'(2) = \left(1 + \frac{1}{2}\right) \frac{4}{3} = \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} = 2$$

سوال ۱۱۶: گزینه

$$f(x) = \begin{cases} |x^2 - 2x| & x < 2 \\ \frac{1}{2}x^2 + ax + b & x \geq 2 \end{cases}$$

| | | | |
|------------|---|---|---|
| $x^2 - 2x$ | + | - | + |
| ○ | ○ | ○ | ○ |

$$\Rightarrow f(x) = \begin{cases} -x^2 + 2x & x < 2 \\ \frac{1}{2}x^2 + ax + b & x \geq 2 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \Rightarrow -4 + 2(2) = \frac{1}{2}(2)^2 + a(2) + b$$

$$\Rightarrow 0 = 2 + 2a + b \Rightarrow [2a + b = -2]$$

$$f'(x) = \begin{cases} -2x + 2 & x < 2 \\ x + a & x > 2 \end{cases} \Rightarrow f'_-(2) = f'_+(2) \Rightarrow 2 + a = -2 \Rightarrow [a = -4]$$

$$\Rightarrow -4 + b = -2 \Rightarrow [b = 6] \Rightarrow a + b = 2$$

سوال ۱۱۷: گزینه

$$f(x) = (x + 2)\sqrt{4x + 1}$$

$$\text{آهنگ متوسط} = \frac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = \frac{(2 + 2)\sqrt{4(2) + 1} - (0 + 2)\sqrt{4(0) + 1}}{2 - 0} = \frac{4\sqrt{9} - 2\sqrt{1}}{2 - 0}$$

$$= \frac{4(3)-2}{2-0} = \frac{10}{2} = 5$$

$$f'\left(\frac{3}{4}\right) \Rightarrow f'(x) = 1 \times \sqrt{4x+1} + (x+2) \frac{4}{2\sqrt{4x+1}}$$

$$\Rightarrow f'\left(\frac{3}{4}\right) = 1 \times \sqrt{4} + \frac{11}{4} \cdot \frac{2}{\sqrt{4}} = 2 + \frac{11}{4} = \frac{19}{4} \Rightarrow 5 - \frac{19}{4} = \frac{1}{4} = 0/25$$

سوال ۱۱۸: گزینه‌ا

$$f'(0) = 0 \Rightarrow f'(x) = 12x^3 + 3ax^2 + 2bx + c \Rightarrow f'(0) = 0 \Rightarrow [c = 0]$$

$$f'(1) = f''(1) = 0 \Rightarrow [12 + 3a + 2b = 0]$$

$$f''(x) = 36x^2 + 6ax + 2b \Rightarrow f''(1) = 0 \Rightarrow 36 + 6a + 2b = 0 \Rightarrow [3a + b = -18]$$

$$\begin{cases} 3a + b = -18 \\ 3a + 2b = -12 \end{cases}$$

$$\Rightarrow b = 6 \Rightarrow a = -6$$

سوال ۱۱۹: گزینه‌ا

$$f'(x) = \frac{(2x+2)(x-1)^2 - 2(x-1)(x^2+2x)}{(x-1)^2} = \frac{2(x-1)((x+1)(x-1) - (x^2+2x))}{(x-1)^2}$$

$$= \frac{2(x-1)((x^2-1) - (x^2+2x))}{(x-1)^2} = \frac{2(x-1)(-2x-1)}{(x-1)^2} \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$$

$$1 - \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2}$$