

فصل ۷

عبارت های گویا : هر عبارت به صورت $\frac{P(x)}{Q(x)}$ که در آن $P(x)$ و $Q(x)$ دو چند جمله ای بوده و $Q(x)$ مخالف صفر باشد را یک عبارت گویا می نامند.

$$\frac{x^r - 2x + 1}{x^r - 3x + 2} = \frac{(x-1)^r}{(x-1)(x-2)} = \frac{(x-1)^r}{(x-2)}$$

مثال : عبارت $\frac{x^r - 2x + 1}{x^r - 3x + 2}$ را ساده کنید.

$$\frac{x+5}{x-1} - \frac{6}{x^r - 1}$$

مثال : حاصل عبارت رویه رو را بیابید.

$$\begin{cases} 1 \Rightarrow x - 1 \\ 2 \Rightarrow x^r - 1 = (x - 1)(x^r + x + 1) \end{cases} \xrightarrow{\text{ک}} x^r - 1$$

$$\frac{x+5}{x-1} - \frac{6}{x^r - 1} = \frac{(x+5)(x^r + x + 1)}{x^r - 1} - \frac{6}{x^r - 1} = \frac{x^r + 6x^r + 6x - 1}{x^r - 1}$$

$$\frac{x^r - 2x + 1}{3x - 6} \div \frac{(x-1)^r}{x^r - 3x + 2}$$

$$\frac{x^r - 2x + 1}{3x - 6} \div \frac{(x-1)^r}{x^r - 3x + 2} = \frac{x^r - 2x + 1}{3x - 6} \times \frac{x^r - 3x + 2}{(x-1)^r} = \frac{(x-1)^r}{3(x-2)} \times \frac{(x-1)(x-2)}{(x-1)^r} = \frac{1}{3}$$

ساده کردن عبارت های مرکب : هنگام ساده کردن هر عبارت گویای مرکب همانند کسرهای مرکب می توان صورت و مخرج را جداگانه ساده سپس آن ها را بر هم تقسیم کرد و یا از همان ابتدا صورت و مخرج را در عبارتی مناسب ضرب کرد.

تقسیم چند جمله ای بر چند جمله ای

برای تقسیم چند جمله ای $A(x)$ بر چند جمله ای غیر صفر $B(x)$ که درجه $A(x)$ بزرگ تر از یا مساوی $B(x)$ باشد مراحل زیر را طی می کنیم.

رابطه ای تقسیم :

اگر چند جمله ای $A(x)$ را بر چند جمله ای غیر صفر $B(x)$ تقسیم کنیم در این صورت همواره خواهیم داشت :

$$\begin{array}{c} A(x) \\ \hline R(x) \end{array} \quad \left| \begin{array}{l} B(x) \\ Q(x) \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} A(x) = Q(x) \times B(x) + R(x) \\ \deg(R(x)) < \deg(Q(x)) \end{array} \right.$$

بخش پذیری : چند جمله ای $A(x)$ را بر چند جمله ای غیر صفر $B(x)$ بخش پذیر گویند هرگاه باقی مانده تقسیم $A(x)$ بر $B(x)$ صفر باشد.

نکته : باقی مانده ای تقسیم $P(x)$ بر $x-a$ برابر است با : $P(a)$

نکته : باقی مانده ای تقسیم $P(x)$ بر $ax-b$ برابر است با : $P\left(-\frac{b}{a}\right)$