





هم کلاسی
Hamkelasi.ir

فصل ۲ دوم(سفری به درون سلول)

در مقایسه سلول جانوری و سلول گیاهی با توجه به شکل زیر ، سلول های جانوری فاقد دیواره ، واکوئل مرکزی و کلروپلاست اند ، البته واکوئل غذایی دارند. تازک ، سانتریول و لیزوژوم هم در بسیاری از گیاهان دیده نمی شود. البته در برخی گیاهان مثل خزه و سرخس سانتریول و تازک دیده می شود.



در شکل بالا ، ساختارهایی که زیرشان خط کشیده شده دارای غشا اند ولی ساختارهای مثل ریبوزوم ، سانتریول ، اسکلت سلولی و هستک غشا ندارند. هسته ، میتوکندری و کلروپلاست اندامک های دوغشایی و دارای DNA اند.

سلون و میون نسبت به سایر سلول ها نسبت سطح به حجم بالایی دارند. سلول ها از حدی کوچک تر نمی شوند چون باید بتواند به **مقدار کافی DNA** ، پروتئین و اندامک را برای زیستن و تولیدمتل را در خود جای دهند. اولین میکروسفرهای که به عنوان سلول تکامل پیدا کرده اند نسبت سطح به حجم کافی داشته اند.



۳. دیواره: در بیشتر باکتری ها وجود دارد عمل حفاظت و شکل دهنده دارد .

۴. کپسول: در بعضی باکتری ها وجود دارد عمل حفاظت و چسبندگی دارد.

۵. ناحیه نوکلئوتیدی: شبیه هسته بوده ولی فاقد پوشش است. در این ناحیه DNA و پروتئین های متصل به آن در تماس مستقیم با سیتوپلاسم است.

۶. در بعضی باکتری ها پلازمید (DNA حلقوی کوچک) به عنوان کروموزوم کمکی وجود دارد.

*غشا باکتری ها دارای زنجیره ای انتقال الکترون و پروتئین دارای فعالیت ATP سازی است.


سلول های یوکاریوتی (آغازی-قارچ-گیاهی و جانوری)

در یوکاریوت ها بیشتر متابولیسم سلولی درون فضای اندامک های غشا دار صورت می گیرد چرا که بیشتر این آنزیم ها درون غشای این اندامک ها وجود دارند.

***دیواره** ی سلولی در بیشتر آغازیان ، همه گیاهان و قارچ ها وجود دارد. کلروپلاست در برخی آغازیان وجود دارد. برخلاف بیشتر سلول های جانوری ، سلول های گیاهی به شکل چندوجهی اند.

وبیگی های تریکوپینا :


آغازی تک سلولی و درگروه مژک داران است. دارای هسته نعلی شکل است. آغازی همانند پارامسی دارای دهان سلولی و مژک است ولی برخلاف آن دارای خارهای اتصال دهنده می باشد. مژک ها در حرکت و تغذیه نقش دارند.



واحد میکروسکوپ :

نوری : این نوع میکروسکوپ هم برای مشاهده نمونه های زنده و هم نمونه های مرده با قدرت تفکیک ۲/۰ میکرون کاربرد دارد.

الکترونی : این نوع میکروسکوپ چندین مدل دارد که دو مدل رایج آن یعنی میکروسکوپ های الکترونی گذاره و نگاره برای نمونه های زنده کاربرد ندارند .



(الف) میکروسکوپ الکترونی گذاره : برای مشاهده ی درون نمونه کاربرد دارد.

(ب) میکروسکوپ الکترونی نگاره : برای مشاهده سطح نمونه و تهیه تصویر سه بعدی کاربرد دارد. قدرت تفکیک میکروسکوپ الکترونی ۰/۰ نانومتر است.

***قدرت تفکیک** عبارت از توانایی یک ابزار نوری در نشان دادن دو جسم به صورت مجزا از یکدیگر. **بزرگنمایی** بزرگ کردن تصویر یک جسم است به عنوان مثال در میکروسکوپ نوری اندازه ی تصویر بصورت زیر بدست می آید: بزرگنمایی عدسی چشمی × عدسی شیئی × اندازه ی نمونه = اندازه ی تصویر ریزنگار : عکسی است که بوسیله میکروسکوپ نوری یا الکترونی از نمونه گرفته می شود.

اندازه و شکل هر سلول به کار آن بستگی دارد. عامل اصلی محدود کننده رشد سلولی کاهش نسبت سطح به حجم است . سلول های کوچک در مقایسه با سلول های بزرگ ولی هم شکل و سلول های دراز و کشیده مثل

فصل ۲ دوم(سفری به درون سلول)

دیواره سلول گیاهی

ضخامت آن ۱۰ تا ۱۰۰ برابر غشا بوده و عدها از جنس سلولز است فیبریل های آن در سیمانی از جنس سایر پلی ساکاریدها و پروتئین قرار دارد. لیگنین(چوب) ، سوبرین(چوب پنه) و کوتین در بعضی دیواره ها وجود دارند.

لان محل نازک شدن دیواره سلولی است تا دو سلول مجاور بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند **پلاسمودس** ماده زنده ای از جنس سیتوپلاسم است که درون منافذ لان جریان دارد و از طریق آن آب ، مواد غذایی و موادشیمیابی منتقل می شوند. سلول های مرده مثل تراکتید ، عناصر آوندی ، فیبر و اسکلرولئید و سلول های کلاهک پلاسمودس ندارند.

تیغه میانی خارجی ترین و قدیمی ترین لایه بوده و نقش چسبندگی دارد و دیواره **پلاسمودس** دومین در سلول های مسن در سطح داخلی دیواره نخستین یعنی نزدیک به غشا ساخته می شود.

ساختار و نقش غشا


۱- مولکول های فسفولیپید بصورت دولایه ی اندکه سرهای آبدوست مولکول ها به سمت خارج و داخل سلول بوده و دم های آبگریز درین دو لایه قرار دارند. (فسفولیپیدها بیش ترین مولکول ها هستند).

۲- پروتئین ها : بعضی پروتئین های سطح خارجی به عنوان پذیرنده با تماس با مولکول ها در اتصال فیزیکی غشا به مولکول ها و سلول ها کمک می کند. پروتئین های سرتاسری به عنوان کanal یا منفذ عمل می کنند که بعضی از آن ها همیشه باز و بعضی در تماس با ماده ی خاص باز می شوند(همه پروتئین های غشا عمل اختصاصی دارند).


۳- کربوهیدرات ها : به صورت خطی یا منشعب و بیشتر در تماس با لیپیدها و پروتئین های سطح خارجی اند(گلیکولیپید و گلیکوپروتئین)

۴- کلسترول : بطور همگن در هر دولایه بالایی و پائینی فسفولیپید شرکت دارد. در غشاء سلول های گیاهی کلسترول وجود ندارد.

غشا یک سد انتخابی در برابر آب و بعضی مواد است ولی مولکول های آب از فضای بین فسفولیپیدها و حتی از درون کانال ها نیز عبور می کند.



*ریبوزوم:




دارای دو بخش بزرگ و کوچک است که هردو بخش از پروتئین ها و RNA تشکیل شده است. انواع ریبوزوم :

ریبوزوم دارای اندازه بزرگ و با ساختار پیچیده این نوع ریبوزوم در درون هسته روی هسته، روی شبکه آندوبلاسمی زیر، درون سیتوسل یوکاریوئی وجود دارد. ولی درون هسته پروتئین سازی انجام نمی دهد. ریبوزوم دارای اندازه کوچک و با ساختار ساده: درون سیتوسل باکتری درون ماتریکس میتوکندری و درون بستره کلروپلاست یافت می شوند. فعالیت ریبوزوم های باکتریایی با آنتی بیوتیک **اریتروماپیسین** متوقف می شود.

***اسکلت سلولی** : از ریز لوله ها (میکروتوبول ها) و ریز رشته های پروتئینی تشکیل شده است و دارای نقش شکل دهنده و استحکام است.

***سانتریول** : استوانه ای توخالی از ۹ دسته سه تایی میکروتوبول است که در سلول های جانوری و گیاهان بدون دانه (خرze و سرخس) وجود دارد. نقش آن سازماندهی میکروتوبول ، سازماندهی دوک تقسیم ، شرکت در ساختار تازک و مژک سلول یوکاریوئی است.

***دستگاه غشا درونی** : اندامک های غشا داری مثل هسته، شبکه آندوبلاسمی، دستگاه گلزی، لیزوژوم، واکوئل و وزیکول های انتقالی را شامل می شود. وظیفه ای این دستگاه دخالت در ساخت، ذخیره و ترشح



با توجه به شکل بالا ، غشای خارجی هسته با غشای شبکه آندوبلاسمی زیر و غشای شبکه آندوبلاسمی زیر با غشای شبکه آندوبلاسمی صاف اتصال فیزیکی دارد ، ارتباط سایر اندامک ها از طریق وزیکول های انتقالی صورت می گیرد.

مثال	سلول یوکاریوئی
اریتروسیت ، سلول غربالی	بدون هسته
پارامسی ، کیسه ریویانی نهاندانگان ، لایه مغذی بساک	دو هسته ای
ماهیچه مخطط ، کیک مخاطی پلاسمودیومی ، نخینه در کیک سیاه نان	چند هسته ای

پروتئین های اسکلت هسته ای به صورت شبکه ی درهم رفته ای هستند که موجب پایداری شکل و پایداری پوشش هسته می شوند. هسته دارای پوشش دوغشایی منفذ دار بوده و تبادل مواد بین هسته و سیتوپلاسم از طریق همین منفذ صورت می گیرد. غشا خارجی هسته با ریبوزوم و شبکه آندوبلاسمی زیر در تماس فیزیکی است. درون شیره ای هسته یک یا چند توده متراکم به نام **هستک** وجود دارد. هستک محل ساخت ریبوزوم ها می باشد و در آن پروتئین های ریبوزومی ، RNA پلیمرازا DNA ، هیستون و وژRNA وجود دارد.

* واژه **آندوبلاسم** در زبان یونانی به معنی درون سلول و واژه **آندوسیتوز** به معنی ورود به سلول است.

فصل ۲ دوم(سفری به درون سلول)

پروتئین ها و آنزیم ها زنجیره ای انتقال الکترون برای تولید ATP در غشای درونی یا سطح آن واقع اند به همین دلیل تعداد کریستالها با افزایش تولید ATP رابطه مستقیم دارند.

*انتقال مواد کوچک از غشا

(۱) انتشار ساده : در این نوع انتقال حرکت ماده در جهت شبیه غلظت خود بوده و هیچ انرژی زیستی (ATP) مصرف نمی شود مثل انتقال اکسیژن و دی اکسید کربن از غشا. دما، تراکم و اندازه مولکول روی سرعت انتشار تاثیر می گذارد. بسیاری از مواد در جهت شبیه غلظت خود از غشا عبور می کنند.

(۲) انتشار تسهیل شده : همانند انتشار ساده است مواد از جای پر تراکم به جای کم تراکم می رود اما مواد با کمک **کانال ها** از عرض غشا عبور می کنند. در انتشار تسهیل شده نیز انرژی زیستی مصرف نمی شود.

(۳) انتقال فعال: حرکت مواد در جهت عکس شبیه غلظت خود می باشد در این نوع انتقال ناقل های پروتئینی به نام **پمپ** شرکت دارند و از انرژی زیستی برای انتقال مواد استفاده می شود. فعالیت پمپ سدیم پتاسیم در غشای نورون ها، جذب آمینواسیدها و مونوساکاریدها توسط سلول های پوششی روده، باز جذب آمینواسیدها، گلوکز، بی کربنات و NaCl در نفرون، ترشح پتاسیم، سم ها و داروها در نفرون، انتقال یون ها از دایره های محیطیه به درون آوند چوبی مثال های از این نوع می باشد.

* انتقال مواد بزرگ از غشا

۱- آندوسیتوز: ورود ذرات بزرگ به درون سلول که با تشکیل وزیکول همراه است، آندوسیتوز نام دارد. فاگوسیتوز (ذره خواری) نیز نوعی آندوسیتوز است. آمیب ها از طریق آندوسیتوز تغذیه می کنند. «ویروس های جانوری از این طریق وارد سلول می شوند.»

۲- اگزوسیتوز : خروج ذرات بزرگ از درون سلول با ادغام وزیکول به غشای پلاسمایی همراه است. آنزیم های گوارشی، پادتن ها از این طریق از سلول ها خارج می شوند.

در آندوسیتوز سطح غشا کم ولی در اگزوسیتوز سطح غشا زیاد می شود.

*** اسمز:** حرکت آب از غشای دارای نفوذ پذیری انتخابی اسمز نامیده می شود و وقتی رخ می دهد که غشا دو محیط با غلظت متفاوت را از هم جدا کرده باشد. در پدیده اسمز آب از محیط رقیق (تراکم زیاد آب) به محیط غلیظ (تراکم کم آب) می رود. سلول های مرده ای فاقد غشا، اسمز ندارند. اسمز سبب **تورژسانس** (تورم سلول) و یا **پلاسمولیز** (بزمدگی سلول) می شود.

۱- بسیاری از سلول ها غذا را می بلعند، لیزوژوم برای گوارش مواد غذایی با واکوئل غذایی ادغام می شوند و **واکوئل گوارشی** را می سازد. ۲- بلع و گوارش اندامک های پیر و فرسوده مثل میتوکندری. ۳- دخالت در نمو جنینی با حذف بافت های بین انگشتان دست و پا، به طوریکه انگشتان از هم جدا می شوند.

واکوئل مرکزی

وجود یک واکوئل مرکزی مختص بسیاری از سلول های بالغ گیاهی است.

نقش واکوئل مرکزی :

۱- به عنوان یک لیزوژوم بزرگ در سلول عمل می کند. ۲- با جذب آب در بزرگ شدن سلول کمک می کند. ۳- مواد **شیمیایی حیاتی** و یا مواد دفعی حاصل از متabolism را در خود ذخیره می کند. ۴- در گلبرگ ها با داشتن رنگیزه ها سبب جذب حشرات گرده افشنان می شوند. ۵- در بعضی گیاهان با نگهداری مواد سمی مانع حمله ی گیاهخواران و آفات به گیاه می شوند. ۶- در گیاهان CAM (کاکتوس، گل ناز) در ثابت CO₂ دخالت دارد.

واکوئل ضربان دار

در تک سلولی های آبزی مثل پارامسی (۲تا) و اوگلنا (یکی) دیده می شود. این واکوئل آب اضافی که وارد سلول می شود را جمع آوری و آن را به خارج سلول دفع می کند و این طریق موجب حفظ محیط درونی سلول می شود.

کلروپلاست: اندامکی دو غشایی با سه فضا است، یکی فضای بین دو غشا درونی و بیرونی، فضای دوم توسط غشای درونی احاطه شده و با ماده ی زمینه ای کلروپلاست استروم (بستر) پر می شود، فضای سوم مربوط به درون لوله ها و قرص های غشادر به نام تیلاکوئید است. به مجموع تیلاکوئیدهای که روی هم قرار گرفته اند گرانوم گویند.

در سلول های گیاهی علاوه بر کلروپلاست، پلاست های دیگری نیز برای ذخیره لیپید، پروتئین، نشاسته و ذرات رنگی وجود دارند.

میتوکندری

اندامکی دو غشایی با دو فضا است که غشای درونی آن دارای چین خوردگی است. ماده زمینه ای میتوکندری **ماتریکس** نام دارد که بیشتر آنزیم های تنفس سلولی در ارتباط با چرخه ای کربس در آن قرار دارد. ولی

شبکه	وظیفه	غشاسازی :
آندوپلاسمی زیر		ساخت پروتئین های ترشحی : آنزیم های گوارشی، هورمون های پروتئینی و پادتن ها توسط این اندامک سنتز می شوند. پادتن ها از چند زنجیره ای پلی پپتید تشکیل شده و درون همین اندامک کامل و فعال می شوند.
آندوپلاسمی صاف	ساخت لیپید : در سلول های چگر موجب تجزیه داروها و مواد مضر می شود.	نمی زدایی : در سلول های چگر تحت تاثیر گلوکagon با تجزیه گلیکوژن به آزاد شدن قند خون کمک می کند.
	تنظیم قند خون : در سلول های چگر تحت تاثیر گلوکagon با تجزیه گلیکوژن به آزاد شدن قند خون کمک می کند.	اقباض ماهیچه : با آزاد کردن کلسمیم به درون سارکوپلاسم موجب کوتاه شدن طول سارکومر ماهیچه می شود.
دستگاه گلزی		توسط میکروسکوپ نوری کشف شد، کیسه های آن برخلاف شبکه ای آندوپلاسمی تماس فیزیکی با هم ندارند. نقش این اندامک :



لیزوژوم لیزوژوم اندامک تک غشایی است که درون آن انواعی از آنزیم های گوارشی وجود دارد. بدون لیزوژوم هیچ سلولی نمی تواند آنزیم های گوارشی را درون خود داشته باشد. لیزوژوم با همکاری شبکه آندوپلاسمی زیر و دستگاه گلزی ساخته می شود.